



SIMPTOMATOLOGIA GASTROINTESTINAL AL MOMENT DEL DIAGNÒSTIC EN PACIENTS AMB MALALTIA CELIACA.

Francisco J. Martínez Cerezo, Gemma Castillejo, Núria Guillen, Vanessa Morente, Josep M. Simó, Joan Marsal, Francisco J. Tena, Domingo Pascual.

Unitat de malaltia celíaca: Serveis d'Aparell Digestiu, Pediatria, Nutrició i dietètica, Anatomia Patològica i Anàlisi clínic. Hospital Universitari Sant Joan. Reus.

El diagnòstic de la malaltia celíaca depèn en bona part del grau de sospita clínica en funció de les seves manifestacions

Objectiu: Valorar els símptomes gastrointestinals predominants en els pacients amb malaltia celíaca al moment del diagnòstic i la seva relació amb els anticossos antitrasglutaminasa (AcTG) i la histologia.

Mètode: S'han inclòs pacients amb malaltia celíaca diagnosticats consecutivament. S'han considerat negatius títols d'AcTG < 3 U/ml, positius entre 3-30 U/ml i positius intensos títols >30 U/ml. Lesions Marsh IIIb o IIIc s'han considerat com a histologia avançada. A tots els pacients se'ls hi ha passat el test GSRS en el moment del diagnòstic. Els resultats d'aquest test s'han analitzat quantitativament i qualitativament considerant per a cada ítem la proporció de malalts que presentaven puntuació >2 (prop>2, 2=molèsties lleugeres). Les variables quantitatives s'expressen com a mitja i desviació típica (dt.) o mitjana segons el tamany de la mostra.

Resultats: S'han inclòs 33 pacients (25 dones, 8 homes) amb edat 38.67 anys (dt. 11.78). Els AcTG eren negatius en 10 pacients, positius en 9 i positius intensos en 14. Dinou pacients presentaven histologies lleus (11 Marsh I, 1 Marsh II i 7 Marsh IIIa) i 14 histologies avançades (12 Marsh IIIb, 2 Marsh IIIc). La mitjana d'edat dels pacients amb AcTG positius (30 a.) era menor que la dels pacients amb AcTG negatius (45.5 a., $p=0.009$) i AcTG positius intensos (42.5 a., $p=0.012$). Pacients amb AcTG positius intensos presentaven major proporció d'histologies avançades (AcTG negatius 0%, AcTG positius 22.22%, AcTG positius intensos 85.71%, $p<0.001$).

La puntuació GSRS total va ser de 29.85 (dt. 18,05). Els símptomes predominants van ser flatulència (mitja 3.18, dt. 1.67, prop>2=72.73%), sensació d'evacuació incompleta (mitja 3.09, dt. 2.14, prop>2=63.64%), distensió (mitja 3.09, dt. 2.15, prop>2=60.61%), sensació de buit epigàstric (mitja 2.24, dt. 1.64, prop>2=45.45%), epigastràlgia (mitja 2.21, dt. 1.82, prop>2=42.42%) i urgència deposicional (mitja 2.03, dt. 2.16, prop>2=33.33%). No hem trobat diferències significatives en la simptomatologia segons l'edat, els nivells d'AcTG, ni la histologia. Les dones presentaven una tendència a presentar més refluxe ($p=0.09$) i significativament més restrenyiment ($p=0.013$) i deposicions dures ($p=0.004$).

Conclusions. La simptomatologia predominant dels pacients amb malaltia celíaca de l'adult és inespecífica i semblant als de patologies funcionals, independentment de la presència d'AcTG, de la histologia i de l'edat dels pacients. Els AcTG es comporten únicament com a predictors d'histologia avançada.