



# XXX Jornada Gastroenterològica de les Comarques Catalanes

12 de maig de 2018

Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Sant Boi de Llobregat

Organitzat per:



## PREVALENÇA DE ACUTE-ON-CHRONIC LIVER FAILURE A L'HOSPITAL DE REFERÈNCIA DE LA PROVÍNCIA DE GIRONA: ESTUDI RETROSPECTIU OBSERVACIONAL

Marc Albert; Isabel Serra; Esther Fort; Carme Lopez; Virginia Piñol, Miriam Sabat; Rosa Durandez; Oriol Miquel; Laia Peries, Laia Gutierrez; Xavier Aldeguer  
Hospital Josep Trueta, Servei Aparell Digestiu.

**INTRODUCCIÓ:** L'anomenat Acute-on-Chronic Liver Failure (ACLF) es tracta d'un síndrome de descripció recent que es defineix per una descompensació de la cirrosi hepàtica amb l'associació de fracàs d'un o més òrgans que comporta una elevada mortalitat a curt termini<sup>1</sup>. L'any 2014 l'estudi CANONIC va permetre la validació dels seus criteris diagnòstics a través d'un estudi multi cèntric a nivell europeu, observant que la seva prevalença es trobava al voltant del 30%<sup>2</sup>.

**OBJECTIU:** Estudi de la prevalença de ACLF en l'hospital de referència de la província de Girona així com de les seves característiques clíniques i analítiques.

**MATERIAL i MÈTODES:** Anàlisi retrospectiu del total de ingressos per cirrosi hepàtica amb codificació en document d'alta hospitalària o epícridi durant el període comprès entre Gener 2017 i Desembre 2017 en l'hospital, excloent aquells ingressos realitzats de forma programada per a procediment diagnòstic o terapèutic. Es recollien dades epidemiològiques (edat i sexe), etiologia de la CH, motiu de ingrés, dades analítiques (bilirrubina, temps de protrombina, albumina, creatinina) i es calculaven scores de Child-Pugh, MELD i CLIF-C OF.

**RESULTATS:** Es van incloure un total de 64 casos (71.8% homes amb edat mitja de 60.7 anys). L'alcohol era l'etiologia més freqüent de cirrosi hepàtica (67.19%) i l'hemorràgia digestiva la causa més freqüent de descompensació (40.63%). S'observa la presència de ACLF en 16 pacients (ACLF 1/2/3: 11/2/3), representant un 25% del total de casos.

**CONCLUSIÓ:** Els resultats obtinguts en el nostre estudi, malgrat la limitació de tractar-se d'un estudi retrospectiu dependent de la codificació hospitalària, mostren una prevalença de ACLF similar a la descrita en la literatura. Són necessaris estudis prospectius per a una millor caracterització del síndrome de ACLF per tal de permetre'n una major identificació i un adequat tractament.